

	○/○ (曜日) 予約時間 (0W)	○/○ (曜日) 予約時間 (☆W)	○/○ (曜日) 予約時間 (☆W)	○/○ (曜日) 予約時間 (☆W)	○/○ (曜日) 予約時間 (☆W)
A型肝炎ワクチン					
B型肝炎ワクチン					
破傷風トキソイド					
狂犬病ワクチン					
日本脳炎ワクチン					
MR (麻疹風疹) ワクチン					
水痘ワクチン					
インフルエンザ					

A型肝炎ワクチン (不活化ワクチン)	2回目の接種が初回接種より 2週間後 になります。2回の接種で初期抗体が確保され1年間は有効と言われております。3回目は、初回接種の日から半年～1年後が目安となっております
B型肝炎ワクチン (不活化ワクチン)	2回目の接種が初回接種日より 4週間後 になります。2回の接種で初期抗体が確保され1年間は有効と言われております。3回目は初回接種の日から半年～1年後が目安となっております。
破傷風トキソイド (不活化ワクチン)	幼少時期に基礎接種してましたら1回の追加接種となります(最終接種後からの経過期間により2回接種の場合あり)。基礎接種を実施していない場合はトータル3回の接種が必要です。2回目の接種は初回接種より 3週間後 に接種が可能です。3回目は初回接種の日から1年後が目安となっております
狂犬病ワクチン (不活化ワクチン)	2回目の接種が 初回接種日の1週間後 になります。 3回目は、 初回接種日の3週間後か4週間後が接種日 となります。 狂犬病は渡航前に必ず3回接種が必要です
日本脳炎ワクチン (不活化ワクチン)	前回の接種後からの期間にもよりますが、幼少時期に基礎接種してましたら1～2回の追加接種となります。基礎接種を実施していない場合は3回の接種が必要です。2回目の接種は初回接種日より1～4週間後になります。3回目は初回接種の日から1年後が目安となっております
MRワクチン ムンプスワクチン 水痘ワクチン (生ワクチン)	1歳以上で「2回」の予防接種の記録がない、または、免疫が不十分(抗体陰性)な方に接種します。 生ワクチンを接種後に生ワクチン接種する場合は4週間開ける必要があります。 (不活化ワクチン接種は翌日から接種が可能です。)

狂犬病は渡航前に必ず3回接種が必要です。2回終了しても有効な免疫は獲得できません。
A型肝炎・B型肝炎ワクチン・破傷風・日本脳炎は最低2回目まで実施しましたら1年程度有効な免疫を確保致します。3回目を接種することで5年以上の免疫を確保することができます。
(2回目までで終了いたしますと1年後から免疫が短期間で低下致します)

※異なる種類のワクチン接種間隔について

「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができます