

ワクチンの種類	生ワクチン(ビケン)	不活化ワクチン(シングリックス筋注用)
接種回数	(皮下注射)1 回	(筋肉内注射)2 回 1 回目から 2 か月の間隔をあけて、かつ 6 か月以内に 2 回目の接種を行う
効果の持続期間 (目安) ※厚労省科学審議会資料より	5~10 年程度	10 年程度
副反応 (頻度の高いもの)	注射部位の赤み・かゆみ・はれなど、発疹、倦怠感などがでることがあります。 赤み(44%)／かゆみ(27%)	多くの方に注射部位の痛みや腫れがあらわれます。そのほか、注射部位以外の筋肉痛、疲労や頭痛などの症状が出る場合があります。 痛み(78%)／赤み(38%)
ワクチン接種ができない方	<ul style="list-style-type: none"> ・免疫が著しく低下する疾病の方(免疫不全状態の方) ・免疫を抑える治療中の方(免疫抑制状態の方) ・妊娠している方 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワクチンの成分により、アナフィラキシーを起こしたことがある方
接種する場合の注意事項	他のワクチンを接種される場合、このワクチンを接種してから 28 日以上あけて接種してください。 新型コロナワクチンとは同時に接種できません。新型コロナワクチンを先に接種した場合、原則として 14 日以上あけて接種してください(2 週間後の同じ曜日から接種可)。	新型コロナワクチンとは同時に接種できません。新型コロナワクチンを先に接種した場合、原則として 14 日以上あけて接種してください (2 週間後の同じ曜日から接種可)。
サナシオクリニック料金	7,700 円(税抜)	21,400 円(税抜)