	乾燥弱毒生水痘ワクチン（ビケン）	乾燥組換え带状疱疹ワクチン（シングリックス）
接種回数（接種方法）	1回（皮下接種）	2回（筋肉接種）
接種スケジュール		通常、1回目の接種から2ヶ月以上かつ6ヶ月以内の間に2回目を接種
効果の持続期間（目安） ※厚労省化学審議会資料より 接種後1年程度 接種後5年程度 接種後10年程度	5～10年程度 6割程度の予防効果 4割程度の予防効果 -	10年程度 9割程度の予防効果 9割程度の予防効果 7割程度の予防効果
副反応	注射部位の赤み・かゆみ・はれなど、発疹、倦怠感などがでることがあり。 赤み（44％）／かゆみ（27％）	多くの方に注射部位の痛みや腫れがあらわる。そのほか、注射部位以外の筋肉痛、疲労や頭痛などの症状が出る場合があります。 痛み（78％）／赤み（38％）
ワクチン接種が出来ない方	<ul style="list-style-type: none"> ・免疫が著しく低下する疾病の方（免疫不全状態の方） ・免疫を抑える治療中の方（免疫抑制状態の方） ・妊娠している方 	<ul style="list-style-type: none"> ・ワクチンの成分により、アナフィラキシーを起こしたことがある方 ・筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方や抗凝固療法を実施されている方は注意が必要
接種する場合の注意事項	他の生ワクチンを接種される場合は、28日以上の間隔をあける必要がある。	医師が必要と認めた場合は、他ワクチンと同時接種が可能
サナシオクリニック料金	7.700円（税別）／回	21.400円（税別）／回